


## Météo de l'herbe du 3 Avril 2018

« Croissance au ralenti »

Après un mois de mars encore « hivernal », le retour de températures plus clémentes est attendu pour retrouver des croissances d'herbe plus conformes au début de la saison de pâturage. La mise à l'herbe retardée en plaine, faute de sols porteurs, devra encore attendre quelques jours sur les premiers plateaux. Veillez à préserver le capital de la prairie en lâchant sur des sols ressuyés pour ne pas compromettre le pâturage de printemps.



### Repères conduite du troupeau : du 26 mars au 2 avril 2018

	39 Foin	39 Ensilage	25-90 Foin	25-90 Ensilage	70 Foin / Enrubannage	70 Ensilage
Lait moyen / vache traite (kg)	22,9	24,0	24,0	25,8	-	-
TB Moyen (g/kg)	37,5	40,2	38,3	40,0	-	-
TP Moyen (g/kg)	32,7	33,7	32,4	33,3	-	-
Valorisation ration de base (kg)	10,1	13,0	11,6	13,0	-	-
Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)	75,6	64,4	71,2	63,4	-	-
g de concentrés / kg de lait	253	211	238	215,	-	-

### Point de vue de l'éleveur : Jean-Marcel Ferrand (Individuel) – Sorans- les-Breurey (70)



« J'ai 40 vaches qui pâturent sur 12 ha de prairies temporaires. En général je lâche de bonne heure. Une année sèche, elles restent dehors de jour comme de nuit. Là je les ai lâchées depuis samedi 24 mars mais seulement la journée. Le vendredi suivant il y avait déjà plus de lait parce que l'herbe qu'elles mangent là est riche !

Quand il y a une bonne pousse elles restent 2 jours par parcelle (2-3 ha) sinon elles restent plutôt une journée. J'ajuste la ration en fonction de l'herbe disponible. Elles ont de l'ensilage de maïs (7 à 12 kg), du foin, un peu de tourteau (1 à 1,5 kg pendant le pâturage) et de VL 18 (au DAC). Je diminue bien le maïs pendant la saison pour qu'elles aient encore faim pour manger l'herbe. » Propos recueillis par Margaux Reboul Salze (CA 70).

### Groupe Herbe Franche-Comté

Réalisé avec le soutien financier de :





Réalisé avec le soutien financier de :

