


Météo de l'herbe du 27 Mars 2018

Les conditions météo capricieuses entre précipitations et fraîcheur retardent le démarrage de végétation. Les premières mises à l'herbe en plaine sont rares bien que la hauteur d'herbe le permette. Dès que le sol est porteur, prévoir un premier passage rapide sur l'ensemble des parcelles destinées au pâturage de printemps. Conserver un complément de fourrages à l'auge pour assurer la transition alimentaire dont la durée sera sans doute réduite.



Repères conduite du troupeau : du 19 au 26 Mars 2018

	39 Foin	39 Ensilage	25-90 Foin	25-90 Ensilage	70 Foin / Enrubannage	70 Ensilage
Lait moyen / vache traite (kg)	22,8	25,8	24,1	27,7	20,6	26,0
TB Moyen (g/kg)	37,7	39,7	37,9	40,4	39,6	40,5
TP Moyen (g/kg)	32,7	33,7	32,5	33,9	32,3	33,5
Valorisation ration de base (kg)	10,0	11,0	11,5	15,4	9,7	13,5
Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)	71,7	76,8	71,6	68,9	63,9	68,8
g de concentrés / kg de lait	256	259	236	207	238	199

Point de vue de l'éleveur : M. Alain BOURGEOIS -GAEC des Pâquerettes – Pully (39)



« Cet hiver, nos 50 vaches ont été nourries au foin et regain, avec 2 kg de notre mélange céréalière (maïs, orge, avoine ou triticale) et 1,3kg de tourteau 30, pour une production moyenne de 20 L.

La production laitière ne connaît de pic car nous préférons étaler les vêlages pour mieux répartir le temps de travail et mieux gérer l'aspect sanitaire des veaux.

D'habitude, on sort les vaches laitières la journée autour du 10 mars selon la portance du sol, et la nuit à partir du 1er mai. Mais cette année elles ne sont pas encore sorties... Ensuite, les vaches alterneront entre pâturage au fil avant sur des paddocks de journée de 1,5 ha en moyenne, et 3 grandes parcelles de nuit attenantes à la ferme.»

Témoignage recueilli par Floriane Marsal Interbio FC

Groupe Herbe Franche-Comté



Réalisé avec le soutien financier de :



RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTÉ